

# FORMATO DE PREPARACIÓN PARA SU RASTREO I131

**NOMBRE COMPLETO:**  
**TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD:**

## ADMISIÓN Y PREPARACIÓN PARA SU CITA:

1. Presentar orden médica del procedimiento y autorización de su empresa, EPS o entidad aseguradora\*.
2. Presentar documento de identificación.
3. En caso de estar o sospechar embarazo, por favor comunicar al personal del servicio de Imágenes Diagnósticas y/o Medicina Nuclear.
4. Debes presentar TSH (debe estar por encima de 30 mU/L), Tiroglobulina, y anticuerpos anti tiroglobulinicos(no mayor a 1 mes).
5. Debes suspender el consumo de hormona tiroidea (**EUTIROX, EUTHROID, TIROXIN, SINTROID y LEVOTIROXINA**) 21 días (tres semanas) antes de la realización de los exámenes de laboratorio (TSH, Tiroglobulina, y anticuerpos antitiroglobulinicos).
6. Ante cualquier pregunta, no dudes en consultarnos: **(605) 642-84-84. Ext: 10600 ó 10900.**

## DURACIÓN DEL ESTUDIO:

1. Debes disponer de aproximadamente 1 (una) hora para la realización de cada estudio.

## DÍA DEL ESTUDIO:

1. Dos (2) horas antes y una hora después de que ingieras el isótopo radioactivo (yodo-131) no debes consumir alimentos.
2. La toma de las imágenes se realiza a las 72 horas (tercer día) luego de la administración del isótopo radioactivo (yodo-131), debes presentarte en el servicio de Imágenes Diagnóstica (Piso 1), no requiere ayuno.
3. Debes traer los estudios radiológicos anteriores relacionados con tu enfermedad. (Gammagrafías, Radiografías, Resonancias, TAC, Ecografía, etc).

## CUIDADOS POSTERIORES Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA:

1. No debes estar en contacto con mujeres embarazadas ni con niños los siguiente 3 días.
2. No compartir habitación ni cama con nadie los siguientes 3 días.

## FORMATO DE PREPARACIÓN PARA SU RASTREO I131

3. No recoger orina en ningún recipiente y después de utilizar el sanitario lavarse las manos con agua y jabón y vaciarlo.
4. Separar los cubiertos y vajillas, lavarlos con jabón y abundante agua o si es de tu preferencia utilizar utensilios desechables.
5. No preparar alimentos a otras personas los siguientes 3 días.