

FORMATO DE PREPARACIÓN PARA SU RENOGRAMA BASAL Y POST CAPTOPRIL

ADMISIÓN Y PREPARACIÓN PARA SU CITA:

1. Presentar orden médica del procedimiento y autorización de su empresa, EPS o entidad aseguradora*.
2. Presentar documento de identificación.
3. En caso de estar o sospechar embarazo, por favor comunicar al personal del servicio de Imágenes Diagnósticas y/o Medicina Nuclear.
4. Deberás presentarte al servicio de Imágenes Diagnósticas (piso 1), veinte (20) minutos antes para realizar trámites administrativos.
5. Debes suspender 3 (tres) días antes del examen medicamentos tales como: IECA (Captopril, Losartan, Benazepril, Ramipril, Enalapril, Lisinopril, entre otros) y los ARA II (Azilsartán, Candesartán, Eprosartán, Ibesartán, Olmesartán, Telmisartán, Valsartán, entre otros).
6. Si por algún motivo no puedes asistir a la cita, deberás llamar a cancelarla mínimo con 24 horas de anticipación.
7. Ante cualquier pregunta, no dudes en consultarnos: **(605) 642-84-84. Ext: 10600 ó 10900.**

DURACIÓN DEL ESTUDIO:

1. La realización del estudio consta de 2 (dos) fases, las cuales se realizarán en 2 (dos) días consecutivos:
 - El primer día disponer de aproximadamente 1 (una) hora.
 - El segundo día disponer de aproximadamente 2 (dos) horas.

DÍA DEL ESTUDIO:

1. No se requiere ninguna preparación en especial, puedes desayunar de forma habitual.
2. Tanto para el primer día como el segundo, 1 (una) hora antes debes empezar a tomar abundantes líquidos (6 vasos) y orinar cada vez que sea necesario.
3. Si sufres de incontinencia urinaria o niños menores traer 2 (dos) pañales limpios.
4. Debes traer los estudios radiológicos anteriores relacionados con tu enfermedad. (Gammagrafías, Radiografías, Resonancias, TAC, Ecografía, etc.).

CUIDADOS POSTERIORES Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA:

1. Si estás en periodo de lactancia, deberás suspenderla por 6 (seis) horas después de la realización del estudio. Esto para reducir la exposición del lactante a la radiación emitida por la madre.

FORMATO DE PREPARACIÓN PARA SU RENOGRAMA BASAL Y POST CAPTOPRIL

2. No hacer filas, ni asistir a lugares públicos en las siguientes 6 (seis) horas.
3. Tomar abundante líquido en las siguientes 24 horas.
4. No estar en contacto con niños o mujeres embarazadas en las siguientes 6 horas.

*Verifique con su entidad prestadora de salud, la documentación que requiere para la prestación de su servicio y así evitar inconvenientes al momento de su atención.